

# Gebrauchsanweisung



## Bestell-Set Nützlinge für Großflächen

1 Stk.

- Nützlinge gegen Bodenschädlinge
- für Haus und Garten
- für bis zu 100 m<sup>2</sup>
- Gutschein jetzt auch online einlösbar

Bestell-Set mit einem Gutschein für einen der unten aufgeführten Nützlinge - wahlweise per Postkarte oder online einzulösen.

Sie erhalten Ihren Wunsch-Nützling nach wenigen Tagen oder zur angegebenen Kalenderwoche als Postsendung in Ihren Briefkasten. Zum Schutz der Nützlinge und zur Sicherung der Qualität findet kein Postversand bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C statt.

Die Nützlinge sind ausreichend für eine Fläche von bis zu 100 m<sup>2</sup> und können im Innenraum und im Freiland eingesetzt werden.

50 Mio. **SC-Nematoden** gegen Maulwurfsgrillen, Wiesenschnaken (Tipula) und Erdräupen oder 50 Mio. **HM-Nematoden** gegen Dickmaulrüssler, Gartenlaubkäfer und Maikäfer



**Artikelnummer** 01017

**GTIN Basisartikel** 4005240010174



## Anwendung

### Nützlinge gegen Bodenschädlinge

- Die Schädlingslarven sollten im Boden vorhanden sein. Eine vorbeugende Anwendung ist nicht sinnvoll.
- Nach einer Gießbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln anderer Hersteller mit Wirkstoffen, die systemisch (von innen) wirken, muss eine Wartezeit von mindestens 6 Wochen eingehalten werden. Die oberirdische Behandlung mit Pflanzenschutzpräparaten ist vor und nach der Nematodenausbringung möglich.
- Die Nützlinge müssen sofort nach Erhalt ausgebracht werden. Nematoden lassen sich jedoch max. 1 Woche im Kühlschrank aufheben.
- Die Nematoden werden in Wasser eingerührt und auf dem befallenen Bodenbereich ausgegossen. Fläche mindestens 14 Tage feucht halten.
- Optimal wirksam ab 12 °C Bodentemperatur. Bei geringeren Temperaturen gehen die Nematoden in eine Kältestarre und bekämpfen keine Bodenschädlinge.

50 Mio. **HM-Nematoden** gegen Dickmaulrüssler, Gartenlaubkäfer und Maikäfer *Heterorhabditis* sp.

- Ausreichend für 100 m<sup>2</sup>.
- Gegen Dickmaulrüssler-Larven: Im Garten am besten im April/Mai oder August/September ausbringen. Wegen der langen Lebensdauer der erwachsenen Käfer mehrere Jahre in Folge anwenden.
- Gegen Larven des Gartenlaubkäfers: Im Garten am besten zwischen Juli und September anwenden. Behandlung im Folgejahr wiederholen.

50 Mio. **SC-Nematoden** gegen Maulwurfgrillen, Wiesenschnaken (*Tipula*) und Erdräupen *Steinernema carpocapsae*

- Ausreichend für 100 m<sup>2</sup>.
- Gegen Larven der Maulwurfgrillen und Wiesenschnaken (*Tipula*), sowie Erdräupen: Gegen Erdräupen von Mai-September behandeln, gegen Maulwurfgrillen von April-Juli.
- Der Einsatz gegen Wiesenschnaken sollte erfolgen, wenn junge Larven bis 1,5 cm im Boden vorhanden sind, im Mai und von August bis Mitte Oktober, wenn der Boden noch über 12 °C warm ist.

## Lagerung

Max. 1 Woche im Kühlschrank lagerfähig.